

ANTIDIABETIQUES en STYLOS JETABLES (VOIE S.C.)

BIEN LES IDENTIFIER POUR NE PAS SE TROMPER



INSULINES

INSULINE « POUR VIVRE » (BASALE)	INSULINE « POUR MANGER » (PRANDIALE)
<ul style="list-style-type: none"> Insuline à action LENTE et ULTRA-LENTE <u>Objectif</u> : équilibrer la glycémie toute la journée 	<ul style="list-style-type: none"> Insuline à action ULTRA-RAPIDE et RAPIDE injectée au moment des repas en fonction de la glycémie avant le repas et du nombre de glucides ingérés L'insuline rapide n'est pas obligatoire <u>Objectif</u> : empêcher l'hyperglycémie après les repas

Différents types d'insuline* (en stylo jetable)	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	Action	
					Délai	Durée
<p>Action ultra-rapide</p>	<p>Insuline ASPARTE</p> <p>FIASP® 100U/mL FlexTouch®</p> <p>NOVORAPID® 100U/mL FlexPen®</p> <p>Insuline GLULISINE</p> <p>APIDRA® 100U/mL SoloSTAR®</p> <p>Insuline LISPRO</p> <p>LYUMJEV® 100U/mL Junior LYUMJEV® 200U/mL KwikPen™</p> <p>HUMALOG® 100U/mL Junior HUMALOG® 100U/mL HUMALOG® 200U/mL KwikPen™</p>		<p>Au moment du repas</p>	<p>Non</p>	<p>5-15min</p>	<p>3H</p>
<p>Action intermédiaire</p>	<p>Insuline humaine ISOPHANE</p> <p>INSULATARD® 100U/mL FlexPen® ou Innolet®</p> <p>UMULINE NPH® 100U/mL KwikPen™</p>		<p>Injection indépendante des repas : à faire systématiquement</p> <p>1 ou 2 injections par jour à heure fixe</p>	<p>⚠ Remettre en suspension</p> <p>1. Saisir le stylo par une extrémité</p> <p>2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet</p>	<p>1H</p>	<p>10-12H</p>

<p>Action lente</p>	<p>Insuline DETEMIR</p> <p>LEVEMIR® 100U/mL FlexPen® ou Innolet®</p>		<p>Injection indépendante des repas : à faire systématiquement</p> <p>1 injection par jour à heure fixe</p>	<p>Non</p> <p>Attention : le stylo XULTOPHY® contient une association médicamenteuse constituée d'insuline dégludec et de liraglutide (analogue GLP-1)</p>	3H	18H
	<p>Insuline GLARGINE</p> <p>ABASAGLAR® 100U/mL KwikPen™</p> <p>LANTUS® 100U/mL SoloSTAR®</p>				1H	24H
	<p>Insuline GLARGINE</p> <p>TOUJEO® 300U/mL SoloSTAR® ou DoubleSTAR®</p>				1H	24-30H
	<p>Insuline DEGLUDEC</p> <p>TRESIBA® 200U/ml FlexTouch®</p>				1H	42H
<p>Action mixte = mélange d'insulines rapide + intermédiaire</p>	<p>Insuline humaine 30</p> <p>UMULINE PROFIL®30 100U/mL KwikPen™</p>		<p>20 à 30 min avant le repas</p>		30min	18H
<p>Action mixte = mélange d'insulines ultra-rapide + intermédiaire</p>	<p>Insuline LISPRO</p> <p>HUMALOG MIX®25 100U/mL KwikPen™</p> <p>HUMALOG MIX®50 100U/mL KwikPen™</p>		<p>Au moment du repas</p>	<p>⚠ Remettre en suspension</p> <p>1. Saisir le stylo par une extrémité</p> <p>2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet</p>	15min	12H
	<p>Insuline ASPARTE</p> <p>NOVOMIX®30 100U/mL FlexPen®</p> <p>NOVOMIX®50 100U/mL FlexPen®</p>					



Pour limiter le risque de confusion des médicaments à risque dans le réfrigérateur (critère certification HAS 2.3-06), je sépare les stylos selon leur durée d'action



Différents types d'insuline* (en stylo jetable)	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	Action	
					Délai	Durée
Association Insuline + Analogue GLP-1	Degludec + Liraglutide XULTOPHY® 100U/mL + 3,6mg/mL		Injection quotidienne Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas, de préférence au même moment chaque jour	Non	3H	42H

ANALOGUES DU GLP-1

Analogues du GLP-1	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	
	Exenatide BYETTA® 5µg BYETTA® 10µg		Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas	Non	
	Liraglutide VICTOZA® 6mg/mL				
	Dulaglutide TRULICITY® 0.75mg TRULICITY® 1.5mg TRULICITY® 3mg TRULICITY® 4.5mg		Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas	Non	
	Exenatide BYDUREON® 2mg				⚠ Remette en suspension 1. Saisir le stylo par une extrémité 2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet
	Sémaglutide OZEMPIC® 0.25mg OZEMPIC® 0.5mg OZEMPIC® 1mg				