

Conserver les SOLUTIONS BUVABLES après ouverture ?

Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques de la région Centre-Val de Loire

Un dispositif d'administration =
un médicament

Garder propre la pipette ou la seringue doseuse
dans la boîte du médicament correspondant
pour ne pas la mélanger avec une autre



Bien reboucher après utilisation.
Conserver le flacon de solution buvable à
l'abri de la lumière et de la chaleur.

- **LA PHARMACIE ① RENSEIGNE SUR L'ÉTIQUETTE** (cf. modèle) **LA DURÉE DE CONSERVATION APRÈS OUVERTURE PUIS ② COLLE L'ÉTIQUETTE SUR LE FLACON DÉLIVRÉ** (*pas sur le bouchon*).
- **L'INFIRMIER(E) RENSEIGNE LA DATE D'OUVERTURE ET LA DATE DE FIN D'UTILISATION.**

Conservation Après Ouverture
..... Mois / Jours
Ouvert le / / 20
Périmé le / / 20

Il est pratiquement impossible d'établir une liste dont l'exhaustivité et l'exactitude soient garanties ; les données peuvent différer selon les sources documentaires. Ce tableau est une aide qui ne vous dispense pas d'une recherche de donnée adaptée au cas par cas et à la situation donnée.

La liste des molécules présentée tient compte des consommations de solutions buvables recensées en 2019 en région Centre Val de Loire.

Liste non exhaustive, données issues de base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr - janvier 2020.

Dénomination commune - DCI	Médicament (par ordre alphabétique)	Conservation APRES ouverture	Conditions de conservation
Colécalciférol	ADRIGYL 10.000 iu/mL, sol buv en gouttes, flac 10 mL	3 mois	< 25°C
Trihexyphénidyle	ARTANE 0.4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL	2 mois	abri de la lumière
	BETAMETHASONE 0.05% sol buv en gouttes, flac 30 mL	2 mois	abri de la lumière
Betaméthasone	CELESTENE 0.05%, sol buv en gouttes, flac 30 mL	3 mois	< 30°C abri de la lumière
Cétirizine	CETIRIZINE 10 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	1 mois	abri de la lumière
Zuclopentixol	CLOPIXOL 2%, sol buv en gouttes, flac 20 mL	6 semaines	< 25°C abri de la lumière
Calcifédiol	DEDROGYL, sol buv en gouttes, flac 10 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
Digoxine	DIGOXINE 5 µg/0.1 mL sol buv en gouttes, flac 60 mL	2 mois	abri de la lumière
Pipampérone	DIPIPERON 40 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 30 mL	1 mois	< 25°C
Flupentixol	FLUANXOL 4%, sol buv en gouttes, flac 10 mL	15 jours	< 25°C
Halopéridol	HALDOL 2 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 30 mL	3 mois	<25°C, ne pas congeler abri de la lumière
plus de 3 substances	HYDROSOL POLYVITAMINE, sol buv en gouttes, flac 20 mL	20 jours	< 25°C
Phénobarbital	KANEURON 5.4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL	18 jours	abri de la lumière
Chlorpromazine	LARGACTIL 4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL ou 125 mL	1 mois	< 25°C abri de la lumière
Levetiracetam	KEPPRA (et générique) sol buv 100mg/mL	7 mois	abri de la lumière
Lévothyroxine	L-THYROXINE 150 µg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	1 mois	entre +2°C et +8°C
Prazepam	LYSANXIA 15 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	1 mois	< 25°C
plus de 3 substances	PHOSPHONEUROS, sol buv en gouttes, flac 120 mL	1 mois	< 25°C abri de la lumière
Clonazépam	RIVOTRIL 2.5 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	4 mois	< 25°C abri de la lumière
Escitalopram	SEROPLEX 20 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	2 mois	< 25°C
Ergocalciférol	STEROGYL, sol buv en gouttes, flac 20 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
Cyamémazine	TERCIAN 40 mg/mL, sol buv gouttes, flac 30 mL ou 100 mL	1 mois	< 30°C abri de la lumière
Alimémazine	THERALENE 4%, sol buv en gouttes, flac 30 mL ou 100 mL	4 mois	< 25°C abri de la lumière
Tiapride	TIAPRIDAL 138mg/ml, sol buv flac 30 mL	45 jours	<25°C
Oxomémazine	TOPLEXIL (et générique) sol buv, 0,33mg/mL	6 mois	< 25°C abri de la lumière
Fluconazole	TRIFLUCAN (et générique) pdre pr susp buv, 50mg/5mL	15 jours	<25°C
Alfacalcidol	UN-ALFA 0.1 µg/goutte, sol buv, flac 10 mL	4 mois	entre +2°C et +8°C abri de la lumière
Diazépam	VALIUM 1%, sol buv en gouttes, flac 20 mL	3 mois	< 25°C
Colécalciférol	ZYMAD 10 000 iu/mL, sol buv, flac compte-gouttes 10 mL	3 mois	< 25°C abri de la lumière
Cétirizine	ZYRTEC 10 mg/mL, sol buv en gouttes, flac 15 mL	3 mois	abri de la lumière

En cas d'absence de données sur un médicament, se rapprocher du médecin ou du pharmacien

Péremption courte (< 1 mois)

FLUANXOL (flupentixol) : **15 jours** après ouverture
HYDROSOL POLYVITAMINE : **20 jours** après ouv.
KANEURON (phénobarbital) : **18 jours** après ouv.
TRIFLUCAN (fluconazole) : **15 jours** après ouv.

Conservation particulière entre +2°C et +8°C

L-THYROXINE (lévothyroxine)
UN-ALPHA (alfacalcidol)



Voir sur site de l'ANSM

Affiche « Ne vous mélangez pas les pipettes »

<https://archive.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Pipettes-et-autres-dispositifs-d-administration-des-solutions-buvables-17-recommandations-aux-industriels-pour-limiter-les erreurs-medicamenteuses-Point-d-Information>

Voir sur le site de l'OMEDIT Centre-Val de Loire

Fiche « Bonnes pratiques de préparation et d'administration des solutions buvables multi doses »

<https://www.omedit-centre.fr/medias/Preparation-administration-solutions-buvables-multidoses.pdf>