



GLIFLOZINES



chez la personne âgée

Prévenir les principaux Effets Indésirables (EI)

Dapagliflozine, Empagliflozine, Canagliflozine

Mycose génitale

Évaluez régulièrement l'état cutanéomuqueux du patient (surtout au niveau du siège), et d'autant plus s'il y a une incontinence associée.




2

Infection urinaire

Elles sont généralement basses. Si 4 cystites ou plus par an, balance bénéfique/risque à réévaluer

Déplétion volémique

Risque d'hypotension orthostatique et de chute. Vigilance en cas d'association avec diurétiques et/ou sacubitril/valsartan, ou déshydratation importante (diarrhée, anorexie...)



3



4

Diminution transitoire du débit de filtration glomérulaire (DFG)

Vigilance avec produits de contraste iodés et médicaments néphrotoxiques
Possible suivi du DFG accentué et adaptation des traitements concomittants (diurétiques...)

EI Rares mais GRAVES

(le plus souvent retrouvés chez le patient diabétique)

Acidocétose diabétique - Amputation de membre inférieur - Gangrène de Fournier

Apprendre à reconnaître les signes précurseurs pour prévenir une prise en charge tardive (ex.: polyurie, douleurs abdominales, tuméfaction ou gonflement au niveau génital ou périnéal, douleur des membres...)



5