

## CONDUITE A TENIR EN CAS D'EXPOSITION ACCIDENTELLE AVEC UN MEDICAMENT CYTOTOXIQUE

Mise à jour : Mai 2018



### BRIS DE FLACON, FUITE DE LIQUIDE OU ECRASEMENT DE COMPRIMES/GELULES

 **Identifier et interdire la zone à risque à l'aide d'un panneau ou d'une affiche**

**1-** Isoler la zone contaminée et éviter tout courant d'air



**2-** Mettre une tenue de protection à usage unique (gants, lunettes, charlotte, masque, surblouse ou combinaison à manche longue, surchaussures). Un KIT d'URGENCE regroupant ces éléments peut être confectionné (cf verso).



**3-** Ramasser les particules de verre et de liquide/solide avec un matériel absorbant (sec si liquide ou humidifié) en cercles concentriques de la périphérie vers le centre

**4-** Jeter les déchets dans un double sac non traversable (sac kraft doublé d'un sac jaune à DASRI)



**5-** Nettoyer la surface avec un détergent/désinfectant (pas d'eau de Javel !) en effectuant 3 lavages avec du matériel à usage unique puis rincer abondamment à l'eau avant de sécher à l'aide de compresses.\*



**6-** Jeter la tenue de protection dans un sac jaune à DASRI et effectuer 2 lavages hygiéniques des mains.

\* Se référer à la procédure interne de l'établissement pour plus de détails



### INOCULATION

**1-** Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes

**2-** Laver au savon doux puis rincer à l'eau

**NB :** Si une grande quantité de produit est injectée, retirer le maximum de produit et traiter comme pour une extravasation



### PROJECTION CUTANEE

**1-** Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes

**2-** Laver au savon doux sans frotter puis rincer à l'eau

**3-** Utiliser si nécessaire une pommade adoucissante non pénétrante de type « ColdCream » en cas de sensation de brûlure



### PROJECTION OCULAIRE

**1-** Rincer immédiatement et abondamment à l'aide d'un kit rince œil ou à défaut une poche de NaCl 0,9% voire l'eau du robinet sans pression pendant au moins 5 minutes, œil maintenu ouvert

**NB-** Pour les porteurs de lentilles, les enlever avec des gants au plus vite et les jeter.

**2-** Consulter les urgences ophtalmiques dans les plus brefs délais

### CONTACT AVEC LES GANTS OU LES VETEMENTS

**GANTS :** Enlever immédiatement les gants, procéder à un lavage hygiénique des mains/avant-bras et changer de gants

 **Ne circuler en aucun cas avec des vêtements souillés**

**VETEMENTS :** Eliminer la tenue de protection, ôter immédiatement les vêtements personnels (blouse, tunique, pantalon), les placer en les roulant dans un sac hydrosoluble ou à défaut identifié et lui-même disposé dans un sac textile fermé dédié au linge contaminé.

**→ Dans tous les cas : faire une déclaration d'accident de service et consulter la médecine du travail**

## COMPOSITION DU KIT D'URGENCE

Produits	Référence de commande dans l'établissement
Paires de gants en nitrile (x2)	
Paire de gants en nitrile manche longue « gants ménage »	
Vêtement de protection à UU (surblouse manche longue resserrée aux poignets, casaque)	
Surchaussures (x4)	
Masque de protection respiratoire haute UU type FFP2	
Lunette de protection	
Feuilles de cellulose absorbante (x10)	
Fiches cartonnées type Bristol pour ramasser les éclats de verre (x2)	
Compresse stériles (x10)	
Savon doux haute fréquence	
Sérum physiologique oculaire (20mL minimum)	
Solution rince œil	
Pommade adoucissante type « Coldcream »	
Flacons 500mL eau versable (x2)	
Sac Kraft	
Sac DASRI	
Sac hydrosoluble pour vêtements souillés	

- Localisation du ou des KITS :

☞ **Penser à renouveler le kit après chaque utilisation, et à surveiller les dates de péremption**

### SOURCES DOCUMENTAIRES

<sup>1</sup>Fiche COMED – CHRU de Tours – Avril 2018

<sup>2</sup>[Conduite à tenir en cas d'incident d'exposition aux médicaments cytotoxiques](#) (pp. 30-34) – Réseau de cancérologie en Occitanie

<sup>3</sup>[Conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle aux chimiothérapies](#) – Réseau régional de cancérologie en Lorraine (ONCOLOR)