

DCI (Dénomination Commune Internationale)	Libellé UCD (nom du médicament)	Broyage	Vigilance	Commentaires (alternative préférentielle, point de vigilance toxicité...)	Interactions à risque (ex : CYP P450, AVK (antivitamines K)..)	Adaptation à la fonction rénale	Charge anticholinergique	Recommandations pour l'administration
VACCINS								
	Vaccins disponibles	Vigilance et remarque			Recommandations Vaccinales		Fréquence de rappel	
PNEUMOCOQUES	PREVENAR®	<p>Toujours se référer aux recommandations vaccinales en vigueur</p> <p>Consulter le calendrier annuel édité par le ministère de la santé</p> <p>Administration possible en même temps qu'un vaccin antigrippal en variant les sites d'injections</p>			<p>Tous les patients âgés de plus de 65 ans immunodéprimés, ainsi que les patients à risque du fait d'une pathologie chronique (cardiaque, respiratoire, rénale, hépatique, diabète) doivent être vaccinés :</p> <p>- Adulte non vacciné : une dose unique de Prevenar®20</p> <p>- Adulte vacciné depuis plus d'un an avec le Pneumovax® : une dose unique de Prevenar®20</p> <p>- Adulte ayant reçu antérieurement la séquence Prevenar®13-Pneumovax® : une dose de Prevenar®20 en respectant un délai de 5 ans après la dernière injection de Pneumovax®.</p>		Dose unique	
GRIPPE	FLUARIX TETRA®, VANIGRIP TETRA®, INFLUVACTETRA®, EFLUEDA®	<p>Remarque : EFLUEDA® recommandé par la SFGG du fait d'une meilleure efficacité lors des essais cliniques (<i>Non disponible pour la saison 2024-2025</i>)</p> <p>Réaction de type fièvre, réaction au point d'injection plus fréquente, pas de différence concernant les EI graves par rapport aux vaccins moins dosés</p>			<p>Vaccination annuelle de l'ensemble des patients âgés de plus de 65 ans</p>		<p>Tous les ans pour toutes les personnes de 65 ans et plus</p>	
COVID-19	COMIRNATY®, NUVAVID®	<p>Administration possible en même temps qu'un vaccin antigrippal en variant les sites d'injection</p>			<p>Rappel de vaccin recommandé pour les patients âgés de 65 ans et plus. Une dose de rappel est recommandée deux fois par an, au printemps et à l'automne, pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les patients âgés de 80 ans et plus ; - Les résidents d'EHPAD et USLD ; - Les patients immunodéprimés 		<p>Le délai à respecter après la dernière injection ou infection est de 6 mois (<i>Sante.gouv avril 2024</i>) ; se référer aux recommandations officielles en vigueur</p>	
ZONA	SHINGRIX®	<p>Administration possible en même temps qu'un vaccin antigrippal en variant les sites d'injections</p> <p>Remarque : Administration possible chez les patients immunodéprimés</p>			<p>Recommandé pour l'ensemble des adultes de 65 ans et plus en deux doses selon un schéma M0-M2, après un délai d'1 an en cas d'infection antérieure de zona ou de vaccination à ZOSTAVAX®.</p> <p><i>A venir - un vaccin adapté au sujet > 75 ans</i></p>		<p>Le délai à respecter entre les deux doses est de 1 à 6 mois</p>	

DCI (Dénomination Commune Internationale)	Libellé UCD (nom du médicament)	Broyage	Vigilance	Commentaires (alternative préférentielle, point de vigilance toxicité...)	Interactions à risque (ex : CYP P450, AVK (antivitamines K).-.)	Adaptation à la fonction rénale	Charge anticholinergique	Recommandations pour l'administration
DIPHTERIE/TETANOS/POLIO MYELITE/COQUELUCHE	REFEVAX®, BOOSTRIX/TETRA®			Administration possible en même temps que d'autres vaccins en variant les sites d'injections	Rappel tous les dix ans recommandé après 65 ans			Tous les 10 ans